



Scheda informativa Campagna vaccinale Antinfluenzale 2019/2020

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze.

Il vaccino viene offerto gratuitamente a coloro che hanno un maggior rischio di complicanze in caso di influenza, ovvero a chi ha un'età pari o superiore ai 65 anni (nati anno 1952 e precedenti) e ai soggetti che appartengono a categorie a rischio.

Il vaccino

La vaccinazione viene eseguita a livello del braccio o nel muscolo della coscia per i bambini piccoli, con iniezione intramuscolo (ad eccezione del vaccino intradermico che viene inoculato nella pelle), in un'unica dose. Solo per i bambini al di sotto dei nove anni d'età mai vaccinati in precedenza si rende necessaria una seconda dose a distanza di almeno quattro settimane dalla prima.

Controindicazioni e precauzioni

Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a:

- Bambini al di sotto dei sei mesi di vita
- Soggetti che abbiano manifestato reazioni allergiche gravi (anaflassi) ad una precedente somministrazione di vaccino o ad uno dei suoi componenti.
- Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce una controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione avvenuta.
- Un'anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barrè (una malattia neurologica) insorta entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino costituisce una controindicazione alla vaccinazione, mentre una sindrome di Guillain-Barrè insorta da più di un anno non correlata a vaccinazione antinfluenzale è motivo di precauzione.

Reazioni indesiderate al vaccino antinfluenzale

I vaccini antinfluenzali contengono solo virus inattivati o parti di questi, pertanto non possono essere responsabili di infezioni da virus influenzali. Gli effetti collaterali comuni dopo somministrazione di vaccino antinfluenzale consistono in reazioni locali in sede di iniezione quali dolore, eritema, gonfiore. Sono possibili reazioni quali malessere generale, febbre, dolori muscolari della durata di 1 o 2 giorni. Vengono raramente segnalate anche reazioni allergiche, compreso shock anafilattico.

Sono stati riferiti, dopo vaccinazione antinfluenzale, eventi rari quali trombocitopenia, nevralgie, parestesie, disordini neurologici.

Ulteriori informazioni possono essere chieste al Medico di fiducia o agli operatori dei centri vaccinali.

Dopo la somministrazione del vaccino è necessario un periodo di osservazione nella sala d'attesa dell'ambulatorio.

Si raccomanda di riferire al proprio Medico di fiducia le eventuali reazioni che insorgono dopo la vaccinazione